

Taulukko 1. Tuberkuloosin peruslääkkeiden merkittävimpiä haittavaikutuksia

Lääke	Yleinen	Harvinainen	Hyvin harvinainen
Isoniatsidi INH	Maksaentsyymiarvojen nousu	Hepatiitti Perifeerinen neuropatia Iho- ja kuumereaktiot	Hemolyyttinen anemia ¹ Agranulosytoosi, neutropenia ¹ Dysartria, huimaus Ärtisyys
Rifampisiini RIF	Maksaentsyymiarvojen nousu <i>Virtsa, hiki ja kyyneleet värjäytyvät oranssinpunaiseksi*</i>	Hepatiitti, bilirubiinitason nousu Pahoinvointi Anoreksia, vatsakivut Iho- ja kuumereaktiot Trombosytopeeninen purpura ¹	Akuutti munuaisvaurio ¹ Hemolyyttinen anemia ¹ Shokki, hengenhädistys ¹
Pyratsiiniamidi PZA	Maksaentsyymiarvojen nousu Pahoinvointi, anoreksia Ihon flush-reaktio Nivelkivut	Hepatiitti Ihoreaktiot Oksentelu Uraattipitoisuuden nousu	Kihti Valoherkkyyshottuma
Etambutoli EMB		Näköhermon tulehdus ^{1, 2} Nivelkivut	Hepatiitti Ihoreaktiot
Streptomysiini SM	Ototoksisuus ^{1, 3} Munuaisten vajaatoiminta Iho- ja kuumereaktiot		

¹ Reaktion aiheuttava lääkehoito on lopetettava pysyvästi

² Näön tarkkuus tai värinäkö (puna-vihreä) huononee toisessa tai molemmissa silmissä.

³ Kuulohäiriöt, huimaus, päänsärky, oksentelu, tinnitus, tasapainohäiriöt.

* Vaaraton haittavaikutus, johon ei tarvitse puuttua, mutta siitä on tärkeä mainita potilaalle