

## Tuberkuloosi teettää toimia työterveyshuollossakin

Seppo Nikkari,  
työterveyshuollon dosentti  
yllilääkäri  
Tullinkulman Työterveys


Työpaikkoja tai ammattiryhmiä, joissa työntekijällä on lisääntynyt riski saada TB-tartunta

- i Keuhkosairauksien klinikka
- i Geriatrinen pitkäaikaissairaanhoido
- i Päihdeongelmaisten laituskuntoutus
- i Päivystyspoliklinikka
- i Obduktioyksikkö
- i Kehitysvammalaitos
- i Vankilassa ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevät

Työympäristöjä, joissa sairas työntekijä on erityinen riski muille

- i Synnytys- ja vastasyntyneiden yksiköt
- i Lastenosastot
- i Lastenneuvolat
- i Immuunipuutteisia potilaita hoitavat
- i Geriatriset pitkäaikaishoitolaitokset
- i Päivähoito, lastenkodit, koulut
- i Kehitysvammalaitokset

Mitä toimia tuberkuloosi teettää työterveyshuollossa?



## Työhöntulotarkastus

- i Onko sairastumisriskiä lisääviä sairauksia tai lääkityksiä:
  - o HIV-positiivisuus on ainoa tilanne, joka rajoittaa työtehtäviä. HIV-positiivinen henkilö ei saa työskennellä osastolla, jossa hoidetaan tuberkuloosipotilaita
- i Tarvittaessa keuhkojen röntgenkuvaus

## Määräaikaistarkastus

- i esim. 3-5 vuoden välein, altistuvilla
- i kiinnitetään huomiota mahdollisiin tuberkuloosin oireisiin
- i annetaan tietoa

### Oireilun pohjalta satunnainen kontakti

- i Yli 3 viikkoa kestänyt yskä, yskökset, veriyssä, hengenhdistus, kuumeilu, laihtuminen, yöhikoilu
- i Keuhkojen röntgenkuvaus
- i Kerätään kolme yskösnäytettä TB-värjäys- ja viljelytutkimuksiin
- i Peruslaboratoriokokeet (PVK, La, CRP, Alat, Afos)

### Mitä sitten, kun jollain työntekijällä on ollut "merkittävä altistus"?

- i alkutarkastus työterveyshuoltoon.
- i Tarkastuksen yhteydessä altistuneelle kerrotaan tuberkuloosista ja sen oireista.
- i Järjestetään keuhkojen röntgenkuvaus 6 ja 12 kk kuluttua altistumisesta.
- i Jos altistus on jatkunut pidempään, otetaan thx-rtg myös heti

### Mitä sitten tehdään, kun jollain on tubi tai ei tiedetä voiko hänet laittaa erityiseen työhön?

- i konsultoidaan puhelimitse TAYS:n keuhkolääkärinä tai infektiolääkärinä

### Mitä sitten, kun tubiepäily tulee vastaanotolle?

- i Hengityssuojaimen käyttö on suositeltavaa, mikäli tutkittavalla epäillään tartuttavaa keuhkotuberkuloosia
- i Tartuttavalta tuberkuloosilta voi suojautua käyttämällä FFP3 -hengityksensuojainta



## Mitä lomakkeita pitää täyttää, jos kyseessä on ammattitubi?

---

- i Työntekijän tuberkuloosi on ammattitauti, kun sen todennäköisesti voidaan katsoa johtuvan työssä saadusta tartunnasta (Ammattitautilaki 1343/1988 1§, Ammattitautiasetus 1347/1988 2§, 3§).
- i Tällöin tehdään E-lausunto ja ilmoitus ammattitaudista (Lomake 106).

## Kiitos!

---

