

Taulukko. Influenssaviruslääkkeiden käyttö uuden A(H1N1)-viruksen aiheuttaman influenssan hoitoon ja ehkäisyyn pandemiatilanteessa*

	Tsanamiviiri	Oseltamiviiri		
Annostus ja antotapa	<p>5 mg/annos inhalaatiojauhe</p> <p>Influenssa A/H1N1:n ehkäisy ja hoito: Aikuiset ja yli 5-vuotiaat: kaksi inhalaatiota x 2/vrk Hoito: 5 vrk Iäkkäät potilaat: Annosta ei tarvitse muuttaa.</p> <p>Altistumisen jälkeinen lyhytaikainen estolääkitys: kaksi inhalaatiota x 1/vrk</p> <p>Hoidon kesto: 10 vrk Hoito tulee aloittaa mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin sisällä altistumisesta aikuisilla ja 36 tunnin sisällä lapsilla.</p> <p>Pitkäkestoinen ennaltaehkäisevä lääkitys: kaksi inhalaatiota x 1/vrk 28 vrk ajan</p>	<p>Kapseli (30 mg, 40 mg ja 75 mg) tai jauhe oraalisuspensiota (12 mg/ml) varten suun kautta</p> <p><u>Influenssa A(H1N1)v:n hoito:</u></p> <p>Aikuiset ja yli 13-vuotiaat: 75 mg x 2/vrk 1-12 vuotiaat lapset: ≤ 15 kg: 30 mg x 2/vrk 15–23 kg: 45 mg x 2/vrk 23–40 kg: 60 mg x 2/vrk >40 kg: 75 mg x 2/vrk 6-12 kk ikäiset lapset: 3 mg/kg x 2/vrk Alle 6 kk ikäiset lapset: 2–3 mg/kg x2 (alle 3 kk ikäiset lapset suositellaan hoidettaviksi sairaalassa mahdollisuuksien mukaan) Hoidon kesto: 5 vrk</p> <p><u>Altistumisen jälkeinen lyhytaikainen estolääkitys:</u></p> <p>Aikuiset 75 mg x1/vrk kymmenen vrk:n ajan. Yli 1-vuotiaat lapset: ≤ 15 kg: 30 mg x 1/vrk 15–23 kg: 45 mg x 1/vrk 23–40 kg: 60 mg x 1/vrk >40 kg: 75 mg x 1/vrk 6-12 kk ikäiset lapset: 3 mg/kg x 1/vrk Alle 6 kk ikäiset lapset: 2-3 mg/kg x 1/vrk Hoidon kesto: 10 vrk Hoito tulee aloittaa mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin sisällä altistumisesta.</p> <p>Pitkäkestoinen ennaltaehkäisevä lääkitys: Aikuiset ja yli 1-vuotiaat lapset influenssaepidemian ajan jopa kuusi viikkoa. Iäkkäät potilaat: Annosta ei tarvitse muuttaa, ellei potilaalla ole munuaisen vajaatoimintaa.</p>		
Annostus munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa	Munuaisten tai maksan vajaatoiminta: annosta ei tarvitse muuttaa	<p>Munuaisten vajaatoiminta:</p> <table border="1"> <tr> <td>Annosta suositellaan pienennettäväksi seuraavasti: Kreatiniini-puhdistuma ml/min</td> <td>Annossuositus</td> </tr> </table>	Annosta suositellaan pienennettäväksi seuraavasti: Kreatiniini-puhdistuma ml/min	Annossuositus
Annosta suositellaan pienennettäväksi seuraavasti: Kreatiniini-puhdistuma ml/min	Annossuositus			

		<table border="1"> <tr> <td>> 30</td> <td>Normaali annos</td> </tr> <tr> <td>>10–30</td> <td>75 mg x 1/vrk tai 30 mg x 2/vrk</td> </tr> <tr> <td>≤10</td> <td>Ei suositella</td> </tr> <tr> <td>dialyysi-potilaat</td> <td>Ei suositella</td> </tr> </table> <p>Maksan vajaatoiminta: annosta ei tarvitse muuttaa</p>	> 30	Normaali annos	>10–30	75 mg x 1/vrk tai 30 mg x 2/vrk	≤10	Ei suositella	dialyysi-potilaat	Ei suositella
> 30	Normaali annos									
>10–30	75 mg x 1/vrk tai 30 mg x 2/vrk									
≤10	Ei suositella									
dialyysi-potilaat	Ei suositella									
Käyttö erityisryhmillä	Keuhkoastmaa ja vaikeaa keuhkohtaumatautiä sairastavilla potilailla noudatettava varovaisuutta									
Vasta-aiheet	Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineelle.	Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineelle.								
Haittavaikutukset	Harvinaisena haittavaikutuksena raportoitu bronkospasmia ja/tai vakavaa hengitystoiminnan heikentymistä potilailla, joilla hengityselinsairaus kuten astma tai keuhkohtaumatauti.	Yleisimmät haittavaikutukset pahoinvointi, ripuli, oksentelu ja vatsakipu.								
Yhteisvaikutukset	Kliinisesti merkittävät lääkeaineinteraktiot epätodennäköisiä.	Kliinisesti merkittävät yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä. Varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä henkilöillä, jotka käyttävät oseltamiviirin kanssa samaa reittiä eliminoituvia lääkkeitä, kuten klorpropamidi, metotreksaatti, tai fenyylibutatsoni.								
Käyttö raskauden ja imetyksen aikana	Ei suositella käytettäväksi raskauden aikana, ellei odotettu hyöty äidille ole suurempi kuin sikiölle mahdollisesti koituva vaara. Tietoa siitä, erittyykö lääkeaine äidinmaitoon, ei ole. Käyttöä imetyksen aikana ei suositella. Pandemiatilanteessa hyötyjen arvioidaan kuitenkin olevan haittoja suurempia ja tällöin tuotetta voidaan käyttää sekä raskaana olevilla että imetyksen aikana lääkärin harkinnan mukaan.	Oseltamiviiria voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana lääkärin harkinnan mukaan ottaen huomioon lääkkeen turvallisuustiedot, kunkin influenssaepidemian oireiden vakavuus ja potilaan kulloinenkin tila.								
Muita huomioitavia asioita	Tehoa ei ole osoitettu iäkkäillä potilailla tai potilailla, joilla on astma tai muita kroonisia hengityselinsairauksia, kroonisia epästabiileja sairauksia tai joiden immuunivaste on heikentynyt.	Turvallisuutta ja tehoa influenssan hoidossa tai ehkäisyssä ei ole osoitettu potilailla, joiden immuunivaste on heikentynyt. Tehoa ei ole osoitettu kroonista sydän- ja/tai hengityselinsairautta sairastavilla potilailla.								

Lähde: Lääkelaitos 3.9.2009

*Tämän taulukon tiedot poikkeavat joiltain osin voimassa olevista valmisteyhteenvedoista, jotka on laadittu kausiluonteisen influenssan hoitoa varten.

Lääkelaitos päivittää tietoa tarvittaessa Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitean CHMP:n suositusten mukaisesti.