

## Latentin tuberkuloosi-infektion hoitoarvio elinsiirtoa suunniteltaessa

Jos elinsiirtoa odottava potilas on saanut tartunnan (LTBI latentti tuberkuloosi-infektio), tuberkuloosiin sairastumisen riski on suurentunut elinsiirron jälkeen johtuen lääkityksiin ja sairauteen liittyvästä immuunivasteen heikentymisestä. Sairastumista voidaan ehkäistä lääkehoidolla.

Riskitekijöiden kartoitus ja oirekysely tehdään poliklinikkakäynnin yhteydessä. Samalla varataan aika keuhkojen röntgenkuvaukseen ja IGRA-verikokeeseen. LTBI:n hoitopäätös tehdään tutkimusten (thoraxkuva, IGRA-testi, riskitekijä- ja oirekysely, tarvittaessa lisätutkimukset) ja kokonaisarvion perusteella.

<b>Riskitekijöiden kartoitus</b> (muut kuin sairauteen liittyvät riskitekijät)	<b>Kyllä</b>	<b>Ei</b>
Onko potilas syntynyt tai asunut korkean TB ilmaantuvuuden maassa? ( <a href="#">THL Maaluettelo</a> sarake viite 1)	Missä maassa:	
Onko potilas sairastanut aiemmin tuberkuloosin?	Milloin:	
Onko potilas altistunut aiemmin tuberkuloosille? (lähipiirissä ollut tuberkuloosia esim. perhe, isovanhemmat, ystävät)	Milloin, kenellä ollut:	
Onko potilas hoitanut työssään tuberkuloosipotilaita?	Missä, milloin:	
Onko potilaalla HIV-infektio?		
Onko potilaalla TNF-salpaajalääkitys?	Mikä:	

<b>Oirekysely</b> Onko potilaalla ollut seuraavia oireita viime viikkojen aikana?	<b>Kyllä</b>	<b>Ei</b>
Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa		
Ysköksiä (limaa yskän mukana)		
Verta yskösliman seassa		
Epätavanomaista rasitushengenahdistusta		
Selittämätöntä lämpöilyä tai kuumeilua		
Tavanomaisesta poikkeavaa yöhikoilua		
Poikkeavaa laihtumista		
<p><b>Jos vastaus on "kyllä" yhteenkin kysymykseen:</b>            Kerätään yskösnäytteet (Ex-TbVrVi x3 ja TbNhO x 1) TB-tutkimuksiin ja konsultoidaan infektio- tai keuhkolääkäriä jatkotutkimusten järjestämisestä. <a href="#">Yskösnäytteen keräysohje usealla kielellä</a></p>		