

## Raskaana olevan tuberkuloosin seulonta keuhkojen röntgenkuvauksella

Neuvolassa tehdään kaikille synnyttäjille alkuraskauden aikana arvio riskiryhmään kuulumisesta. Riskiryhmään kuuluva oireeton synnyttäjä ohjataan keuhkojen röntgenkuvaukseen raskauden viimeisen kolmanneksen aikana (noin 4-6 viikkoa ennen laskettua aikaa). Kuvauksen päivämäärä ja tulos kirjataan sähköisesti ja äitiyskorttiin. Seulontakuvauksella varmistetaan, että odottava äiti ei sairasta keuhkotuberkuloosia. Seulonnalla edistetään äidin, sikiön ja koko perheen terveyttä sekä ehkäistään tuberkuloositartuntoja neuvolassa ja synnytys sairaalassa. Seulontakuva otetaan riskiryhmään kuuluvilta ennen iokaista svnnvtvstä.

### Odottava äiti kuuluu riskiryhmään, jos vastaus on "kyllä" yhteenkin kysymykseen

Kysymys: Onko odottava äiti	Kyllä	Ei
kotoisin, asunut tai muutoin oleskellut > 3kk ajan (tai toistuvasti vierailut esim. sukulaisten luona) TB-riskimaassa? ( <a href="#">THL maaluettelo</a> Odottavan äidin keuhkokuvaselonta)	Maa:	
saapunut Suomeen pakolaisena tai turvapaikanhakijana?	Mistä:	
saapunut Suomeen konfliktialueelta tai oleskellut pakolaisleirillä?	Missä:	
sairastanut aiemmin tuberkuloosin?	Milloin:	
altistunut aiemmin tuberkuloosille lähipiirissä tai työssä?	Kenellä TB, milloin:	
hoitanut työssään TB-potilaita - TB-riskimaassa (THL maaluettelo, ks edellä)? - Suomessa tai matalan TB-riskin maassa ilman asianmukaisia FFP2/3 hengityssuojaimia?	Missä, milloin:	
<b>Keuhkojen röntgenkuvaus tehdään riskiryhmään kuuluvalla</b> Odottavalle äidille annetaan <a href="#">Ohje tuberkuloosin seulonnasta</a> ja ohjataan tutustumaan tuberkuloosi.fi -sivustoon.	Kuvauksen suunniteltu ajankohta:	Miksi ei?

## Oirekysely

Oirekysely tehdään neuvolassa riskiryhmään kuuluvalla alkuraskauden aikana ennen ensimmäistä lääkärintä. Oirekysely toistetaan synnytysvastaanotolla sairaalassa.

Onko odottavalla äidillä ollut seuraavia oireita viime viikkojen aikana?	Kyllä	Ei
Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa		
Ysköksiä (limaa yskän mukana)		
Verta yskösliman mukana		
Epätavanomaista räsitusnahanahdistusta		
Selittämätöntä lämpöilyä tai kuumeilua		
Tavanomaisesta poikkeavaa yöhikoilua		
Poikkeavaa laihtumista		

Jos vastaus on "kyllä" yhteenkin kysymykseen, pyydetään lääkärin arvio tilanteesta. Tuberkuloosia epäiltäessä oireiselta otetaan keuhkojen röntgenkuva raskauden vaiheesta riippumatta. TB yskösnäytteet (Tb värjäys ja viljely x3, TbNho x 1) kerätään herkästi mahdollisten muiden tutkimusten ohella. Tarvittaessa kysytään ysköskeräyksen ohjeet hyvinvointialueen /HUS tartuntatautiyksiköstä. [Yskösnäytteen keräysohje usealla kielellä](#) Toteutuksesta ja jatkotoimista konsultoidaan infektio- tai keuhkolääkäriä.